

Información para el paciente
HUMALOG® (HU-ma-log)
(Inyección de insulina lispro)

¿Qué es HUMALOG?

- HUMALOG es una insulina de acción rápida artificial para controlar los altos niveles de azúcar en la sangre en adultos y niños con diabetes mellitus.
- No se sabe si HUMALOG es seguro y efectivo en niños menores de 3 años o cuando se usa para tratar niños con diabetes mellitus tipo 2.

¿Qué personas no deben usar HUMALOG?

No use HUMALOG si usted:

- tiene un episodio de bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia).
- es alérgico a HUMALOG o a cualquiera de los ingredientes de HUMALOG.

Antes de usar HUMALOG, informe a su profesional de la salud sobre sus afecciones médicas, incluso si usted:

- **tiene problemas de riñón o hígado.**
- toma cualquier otro medicamento, especialmente aquellos comúnmente denominados TZD (tiazolidinedionas).
- tiene insuficiencia cardíaca u otros problemas cardíacos. Si usted tiene insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG.
- **tiene alguna otra afección médica.** Algunas afecciones médicas pueden afectar sus necesidades de insulina y su dosis de HUMALOG.
- **está embarazada o planea quedar embarazada.** Hable con su profesional de la salud si está embarazada o planea quedar embarazada. Debería decidir con su profesional de la salud sobre la mejor manera de manejar su diabetes mientras esté embarazada.
- **está en periodo de lactancia o planea lactar.** No se sabe si HUMALOG pasa a la leche materna. Debería decidir con su profesional de la salud si utilizará HUMALOG mientras está lactando.

Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos recetados o de venta libre, vitaminas o suplementos de hierbas.

Antes de comenzar a usar HUMALOG, hable con su profesional de la salud sobre el bajo nivel de azúcar en la sangre y cómo manejarlo.

¿Cómo debo usar HUMALOG?

- Lea las **Instrucciones de uso** que vienen con HUMALOG.
- **No comparta su HUMALOG KwikPen, cartuchos, una pluma reutilizable compatible con los cartuchos Lilly de 3 mL ni jeringas con otras personas, incluso si se ha cambiado la aguja. Podría transmitir una infección grave a otras personas, o ser infectado por ellas.**
- Use HUMALOG exactamente como le indique su profesional de la salud.
- **HUMALOG empieza a actuar rápidamente**, por lo que debe inyectarse dentro de los 15 minutos antes de comer o justo después de comer.
- Conozca el tipo y la potencia de la insulina que usa. **No** cambie el tipo de insulina que usa a menos que su profesional de la salud se lo indique. Es posible que deba cambiar la cantidad de insulina y el mejor momento para tomarla si usa un tipo diferente de insulina.
- **Verifique sus niveles de azúcar en la sangre.** Pregunte a su profesional de la salud cuáles deberían ser sus niveles de azúcar en la sangre y cuándo debe verificar su nivel de azúcar en la sangre.

¿Qué debo evitar mientras uso HUMALOG?

Mientras usa HUMALOG, no haga lo siguiente:

- Conducir u operar maquinaria pesada, hasta que sepa cómo le afecta HUMALOG.
- Beber alcohol o usar medicamentos recetados o de venta libre que contengan alcohol.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HUMALOG?

HUMALOG puede causar efectos secundarios graves, incluso:

- **bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Los signos y síntomas que pueden indicar un bajo nivel de azúcar en la sangre incluyen:
 - mareos o aturdimiento, sudoración, confusión, dolor de cabeza, visión borrosa, dificultad para hablar, temblores, latidos cardíacos rápidos, hambre, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor.

Su dosis de HUMALOG quizás deba cambiar debido a:

- cambio en el nivel de actividad física o ejercicio, aumento o pérdida de peso, cambio en la dieta, enfermedad.

- **reacciones alérgicas graves (reacción alérgica en todo el cuerpo).** Obtenga ayuda médica inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas de una reacción alérgica:

- una erupción en todo el cuerpo, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos, sudoración, sensación de desmayo.
- **bajo nivel de potasio en su sangre (hipopotasemia).**
- **insuficiencia cardíaca.** Tomar ciertas píldoras para la diabetes llamadas tiazolidinediona o "TZD" con HUMALOG puede causar insuficiencia cardíaca en algunas personas. Esto puede suceder aunque usted nunca antes haya tenido insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos. Si usted ya tiene insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG. Su profesional de la salud debe controlarlo atentamente mientras usted toma TZD con HUMALOG. Informe a su profesional de la salud si tiene cualquier síntoma nuevo de insuficiencia cardíaca o que empeora, incluidos:
 - dificultad para respirar
 - hinchazón de tobillos o pies
 - aumento repentino de peso.

Su profesional de la salud podría tener que ajustar o interrumpir el tratamiento con TZD y HUMALOG si usted tiene una insuficiencia cardíaca nueva o que empeora.

Los efectos secundarios más comunes de HUMALOG incluyen:

- bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia), reacciones en el lugar de la inyección, engrosamiento de la piel o picaduras en el lugar de la inyección (lipodistrofia), picazón (prurito), erupción.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de HUMALOG.

Llame a su médico para solicitar asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088.

Información general acerca del uso seguro y efectivo de HUMALOG.

- En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos de los que figuran en un folleto de información para el paciente. Puede solicitar a su farmacéutico o profesional de la salud información sobre HUMALOG redactada para los profesionales de la salud.
- No use HUMALOG para una afección para la cual no fue recetado. **No** entregue ni comparta HUMALOG con otras personas, aunque también tenga diabetes. Podría causarles daño.

¿Cuáles son los ingredientes de HUMALOG?

Ingrediente activo: insulina lispro

Ingredientes inactivos: glicerina, fosfato sódico dibásico, metacresol, óxido de zinc (ion de zinc), cantidades mínimas de fenol y agua para inyección

Las marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios y no son marcas registradas de Eli Lilly and Company.

Humalog® y Humalog KwikPen® son marcas comerciales registradas de Eli Lilly and Company.

Lilly

Comercializado por: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, EE. UU.

Para más información, visite www.humalog.com o llame al 1-800-545-5979.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.

Información para el paciente actualizada: 13 de agosto de 2018

Derechos de autor © 1996, 2018, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

LOG-0003-PPI-20180813

PP-HI-US-1210 07/2018 IMPRESO EN EE. UU. ©Lilly USA, LLC 2018.

Todos los derechos reservados.

