

**Guía de medicamento
inyección de TRULICITY®
(dulaglutide)
para uso subcutáneo**

Lea esta Guía del medicamento antes de comenzar a usar TRULICITY y cada vez que surta una receta. Puede haber información nueva. Esta información no sustituye la consulta con el proveedor de atención médica sobre su condición médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TRULICITY?

TRULICITY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Posibles tumores tiroideos, incluido el cáncer.** Informe a su proveedor de atención médica si siente un bulto o inflamación en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o falta de aliento. Estos pueden ser síntomas de cáncer de tiroides. En los estudios con ratas y ratones, TRULICITY y los medicamentos que funcionan como TRULICITY causaron tumores tiroideos, incluido el cáncer de tiroides. No se sabe si TRULICITY causará tumores tiroideos o un tipo de cáncer de tiroides denominado carcinoma medular tiroideo (CMT) en las personas.
- No utilice TRULICITY si usted o un miembro de su familia tuvo en algún momento un tipo de cáncer de tiroides denominado carcinoma medular tiroideo o si tiene una condición del sistema endocrino denominada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

¿Qué es TRULICITY?

TRULICITY es un medicamento inyectable recetado que puede mejorar la glucosa (azúcar) en sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2, y debe utilizarse acompañado de una dieta y ejercicio.

- No se recomienda TRULICITY como la primera opción de medicamento para tratar la diabetes.
- No se sabe si TRULICITY puede administrarse a las personas que tuvieron pancreatitis.
- TRULICITY no es un sustituto de la insulina y no debe utilizarse en personas con diabetes tipo 1 o cetoacidosis diabética.
- No se recomienda el uso de TRULICITY en personas con problemas estomacales o intestinales graves.
- No se sabe si TRULICITY es seguro y efectivo para usarlo en niños. TRULICITY no debe utilizarse en niños menores de 18 años de edad.

No use TRULICITY si:

- Usted o algún miembro de su familia padeció en algún momento un tipo de cáncer de tiroides denominado carcinoma medular tiroideo (CMT) o si tiene una condición del sistema endocrino denominada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Es alérgico a la dulaglutide o cualquiera de los ingredientes de TRULICITY. Consulte “¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TRULICITY?” Consulte en el final de la Guía del medicamento la lista completa de los ingredientes de TRULICITY.

Antes de utilizar TRULICITY, consulte con su proveedor de atención médica si usted tiene alguna condición médica, incluyendo:

- Tuvo o tiene problemas en el páncreas, riñones o hígado.
- Tiene problemas estomacales graves, tal como un vaciado lento del estómago (gastroparesia) o problemas con la digestión de la comida.
- Está embarazada o planea estarlo. No se sabe si TRULICITY puede dañar al feto. Dígame al proveedor de atención médica si queda embarazada mientras usa TRULICITY.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si TRULICITY pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si debe amamantar mientras toma TRULICITY.

Dígale al proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos sin receta y con receta, vitaminas y suplementos herbales. TRULICITY puede afectar la forma en que actúan algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa TRULICITY.

Inyección de TRULICITY (dulaglutide)
para uso subcutáneo

TRU-0004-MG-20170801

Antes de usar TRULICITY, hable con su proveedor de atención médica sobre la glucosa baja en sangre y la forma de manejarla. Comente con su proveedor de atención médica si toma otros medicamentos para tratar la diabetes, incluso insulina o sulfonilureas.

Conozca los medicamentos que toma. Tenga una lista de ellos para mostrar a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

¿Cómo debo usar TRULICITY?

- Lea las **Instrucciones de uso** que se proporcionan con TRULICITY.
- Use TRULICITY exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Su proveedor de atención médica debe mostrarle cómo usar TRULICITY antes de que usted lo use por primera vez.
- TRULICITY se inyecta bajo la piel (de forma subcutánea) del estómago (abdomen), muslo o parte superior del brazo. **No** inyecte TRULICITY en el músculo (de forma intramuscular) o vena (de forma intravenosa).
- **Use TRULICITY una vez por semana, el mismo día todas las semanas, en cualquier momento del día.**
- Puede cambiar el día de la semana siempre que la última dosis haya sido administrada **3** o más días antes.
- Si se olvida una dosis de TRULICITY, tome la dosis que se olvidó lo antes posible si faltan al menos **3** días (72 horas) hasta la siguiente dosis programada. Si faltan menos de **3** días, omita la dosis que olvidó y administre la siguiente dosis en el día regularmente programado. **No** administre **2** dosis de TRULICITY con un plazo de **3** días entre una y otra.
- TRULICITY se puede tomar con o sin alimento.
- **No** mezcle insulina y TRULICITY juntos en la misma inyección.
- Puede inyectar TRULICITY e insulina en la misma zona del cuerpo (por ejemplo, la zona del estómago), pero no una al lado de la otra.
- Cambie (rote) su sitio de inyección en cada inyección semanal. **No** use el mismo sitio para cada inyección.
- Si consume demasiado TRULICITY, llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato.
- **No comparta la pluma de TRULICITY, la jeringuilla o las agujas con otra persona.** Puede contagiar a otra persona con una infección o contagiarse usted de los demás.

Es posible que deba cambiar su dosis de TRULICITY y otros medicamentos para la diabetes por causa de:

- Un cambio en el nivel de actividad física o ejercicio, aumento o pérdida de peso, aumento del estrés, enfermedad, cambio en la dieta o por los demás medicamentos que toma.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TRULICITY?

TRULICITY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TRULICITY?”
- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deje de usar TRULICITY y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si siente dolor fuerte en la zona del estómago (abdomen) que no cesa, con o sin vómitos. Puede sentir que el dolor va desde el abdomen a la espalda.
- **Glucosa baja en sangre (hipoglucemia).** Su riesgo de tener glucosa baja en sangre puede ser más alto si usa TRULICITY con otro medicamento que puede causar hipoglucemia, tal como una sulfonilurea o insulina.

Los signos y síntomas de glucosa baja en sangre pueden incluir:

- vértigo o mareos
- dolor de cabeza
- ansiedad, irritabilidad o cambios de humor
- sudoración
- visión borrosa
- hambre
- confusión
- dificultad para hablar
- debilidad
- o somnolencia
- temblores
- sentirse inquieto
- taquicardia

Inyección de TRULICITY (dulaglutide)
para uso subcutáneo

TRU-0004-MG-20170801

- **Reacciones alérgicas graves.** Deje de usar TRULICITY y obtenga ayuda médica de inmediato si presenta algún síntoma de reacción alérgica grave, lo que incluye:
 - hinchazón del rostro, labios, lengua o garganta
 - desmayo o mareos
 - problemas para respirar o tragar
 - ritmo cardíaco muy rápido
 - sarpullido grave o picazón
- **Problemas renales (insuficiencia renal).** En las personas con problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar deshidratación (pérdida de líquido), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren.
- **Problemas estomacales graves.** Otros medicamentos como TRULICITY pueden causar problemas estomacales graves. No se sabe si TRULICITY causa o empeora los problemas estomacales.

Los efectos secundarios más comunes del TRULICITY pueden incluir:

- náuseas
- dolor abdominal
- diarrea
- disminución del apetito
- vómitos

Hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de TRULICITY.

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y efectivo de TRULICITY.

Hay ocasiones en que los medicamentos se recetan para otros fines que los enumerados en una Guía del Medicamento. No use TRULICITY para una enfermedad distinta a su uso previsto. No dé TRULICITY a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede dañarlos.

Esta Guía del Medicamento resume la información más importante sobre TRULICITY. Hable con su proveedor de atención médica si desea más información. Puede preguntar a su farmacéutico o proveedor de atención médica por la información sobre TRULICITY que fue escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de TRULICITY?

Ingrediente activo: dulaglutide

Ingredientes inactivos: ácido cítrico anhidro, manitol, polisorbato 80, citrato trisódico dihidratado, en agua para inyección.

TRULICITY® es una marca registrada de Eli Lilly and Company.



Fabricado por: Eli Lilly and Company, Indianápolis, IN 46285, EE. UU., número de licencia en Estados Unidos 1891 www.TRULICITY.com.

Copyright © 2014, 2018 Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, visite www.TRULICITY.com o llame al 1-800-545-5979.

Esta Guía del Medicamento fue aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos.

Revisado: Agosto de 2017

TRU-0004-MG-20170801

PP-DG-US-1735



Inyección de TRULICITY (dulaglutide) para uso subcutáneo

TRU-0004-MG-20170801