

## Información para el Paciente

### HUMALOG KwikPen®

#### Inyección de insulina lispro 200 U (200 unidades por ml)

**No comparta su HUMALOG KwikPen ni agujas con otra persona, aunque se haya cambiado la aguja. Puede transmitirles a otras personas una infección grave o contraer una infección de ellas.**

#### ¿Qué es HUMALOG?

- Humalog es una insulina artificial de acción rápida que se utiliza para controlar el alto nivel de azúcar en la sangre en adultos y niños con diabetes mellitus.
- Esta HUMALOG KwikPen (“pluma”) para uso en un solo paciente contiene 2 veces más insulina (200 U/ml) en 1 ml que la insulina estándar (100 U/ml).
- Se desconoce si HUMALOG es segura y eficaz en niños menores de 3 años.
- Se desconoce la seguridad y eficacia de HUMALOG en niños con diabetes tipo 2.

#### ¿Qué personas no deben usar HUMALOG?

##### No use HUMALOG si usted:

- está experimentando un episodio de bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia);
- tiene alergia a la insulina lispro o a alguno de los componentes de HUMALOG. Consulte el final de esta ficha de Información para el paciente para obtener una lista completa de los componentes de HUMALOG.

#### ¿Qué le debo decir a mi profesional de la salud antes de usar HUMALOG?

##### Antes de empezar a utilizar HUMALOG, informe a su proveedor de salud sobre su condición médica, incluso si:

- Tiene problemas de hígado o riñones;
- Toma cualquier otro medicamento, especialmente aquellos denominados TZD (tiazolidinedionas);
- Tiene insuficiencia cardíaca u otros problemas cardíacos. Si usted tiene insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de salud sobre la mejor manera de controlar su azúcar en la sangre si planea quedar embarazada o mientras está embarazada.
- Está amamantando o planifica hacerlo. Hable con su proveedor de salud sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras utiliza HUMALOG.

**Informe a su proveedor de salud sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con prescripción y los medicamentos sin receta, las vitaminas y los suplementos de hierbas.

**Antes de empezar a utilizar HUMALOG, hable con su proveedor de salud sobre los bajos niveles de azúcar en la sangre y sobre cómo controlarlos.**

#### ¿Cómo debo usar HUMALOG KwikPen?

- Lea las **Instrucciones de uso** detalladas que se incluyen con el producto HUMALOG KwikPen.
- Siga estrictamente las indicaciones de su proveedor de salud cuando utilice HUMALOG KwikPen. Su proveedor de salud debería indicarle la dosis de HUMALOG que debe administrarse y el momento en el que debe administrarla.
- Conozca el tipo, la fuerza y la cantidad de insulina que utiliza. **No** cambie la cantidad de insulina que utiliza a menos que se lo indique su proveedor de salud. La cantidad de insulina y el mejor momento para que usted utilice su insulina puede tener que cambiar si usted utiliza diferentes tipos de insulina.
- Compruebe su etiqueta de insulina cada vez que se la inyecte para asegurarse de que esté utilizando la insulina correcta.
- HUMALOG viene en una KwikPen que es una pluma precargada desechable para uso en un solo paciente que debe usar para administrar HUMALOG. La ventana de la pluma muestra su dosis de HUMALOG. **No** realice ningún cambio de dosis a menos que su proveedor de salud le indique lo contrario.
- **No** utilice una jeringuilla para extraer HUMALOG de su pluma precargada KwikPen.

HUMALOG KwikPen®  
Inyección de insulina lispro

LOG200-0003-PPI-20191115

- **No** reutilice las agujas. Siempre use una aguja nueva para cada inyección. La reutilización de agujas aumenta el riesgo de obstrucciones en la aguja, lo que puede causar que usted reciba la dosis incorrecta de HUMALOG. La utilización de una aguja nueva para cada inyección también reduce el riesgo de contraer una infección. Si la aguja está obstruida, siga las instrucciones de la sección “**Información general sobre el uso seguro y efectivo de su pluma**” de las Instrucciones de uso.
- **HUMALOG es una insulina de acción rápida. Inyecte HUMALOG dentro de los 15 minutos antes o justo después de una comida.**
- Inyecte HUMALOG debajo de la piel (por vía subcutánea) del área estomacal, glúteos o la parte superior de los brazos o las piernas. **No** utilice HUMALOG KwikPen (“pluma”) en una bomba de insulina ni inyecte HUMALOG KwikPen en su vena (por vía intravenosa).
- **Cambie (varíe) los lugares de inyección dentro del área que elija para cada dosis** a fin de reducir el riesgo de presentar lipodistrofia (agujeros en la piel o engrosamiento de la piel) y amiloidosis cutánea localizada (piel con bultos) en los lugares de inyección.
  - **No** se inyecte en el mismo lugar cada vez.
  - **No** se inyecte en zonas donde la piel esté engrosada o presente agujeros o bultos.
  - **No** se inyecte en zonas donde la piel esté sensible, con moretones, escamosa o dura, ni en cicatrices o piel dañada.
- **No** mezcle la HUMALOG en la HUMALOG KwikPen con ningún otro tipo de insulina o medicamento líquido.
- **Compruebe sus niveles de azúcar en la sangre.** Pregunte a su proveedor de salud cuál debería ser su nivel de azúcar en sangre y cuándo debería comprobar este nivel.

**Mantenga HUMALOG y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

#### Puede tener que cambiar su dosis de HUMALOG debido a:

- un cambio del nivel de ejercicio o actividad física, aumento o pérdida de peso, aumento del estrés, enfermedades, cambios en la dieta o debido a otros medicamentos que esté tomando.

#### ¿Qué debería evitar mientras uso HUMALOG KwikPen?

##### Mientras use HUMALOG KwikPen:

- no conduzca ni opere maquinaria pesada, hasta que no sepa cómo le afecta HUMALOG KwikPen;
- no consuma alcohol ni tome medicamentos con prescripción o de venta libre que contengan alcohol.

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HUMALOG?

**HUMALOG puede provocar efectos colaterales graves que pueden provocar la muerte, incluido:**

- **bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Los signos y síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre pueden incluir:
  - mareos o aturdimiento
  - sudoración
  - confusión
  - dolor de cabeza
  - visión borrosa
  - dificultad para hablar
  - inestabilidad
  - latido cardíaco rápido
  - ansiedad, irritabilidad
  - cambios de humor
  - hambre

Su proveedor de salud puede prescribir un kit de emergencia de glucagón para que alguien más le pueda administrar glucagón si su azúcar en la sangre se vuelve demasiado baja (hipoglucemia grave) y no puede tomar azúcar por vía oral.

- **Reacciones alérgicas severas (reacción de todo el cuerpo).** **Busque inmediatamente atención médica si experimenta alguno de los siguientes signos y síntomas de reacciones alérgicas severas:**
  - una erupción en todo el cuerpo
  - un latido cardíaco rápido
  - problemas para respirar
  - sudoración
- **nivel bajo de potasio en la sangre (hipocalcemia).**
- **insuficiencia cardíaca.** Tomar ciertas píldoras para la diabetes llamadas tiazolidinediona o “TZD” con HUMALOG puede causar insuficiencia cardíaca en algunas personas. Esto puede ocurrir, aunque nunca haya experimentado ataques o problemas cardíacos antes. Si usted ya tiene insuficiencia

HUMALOG KwikPen®  
Inyección de insulina lispro

LOG200-0003-PPI-20191115

cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG. Su profesional de la salud debe controlarlo atentamente mientras usted toma TZD con HUMALOG. Informe a su proveedor de salud si está experimentando nuevos síntomas de ataques cardíacos o si estos síntomas empeoran, incluidos:

- dificultad para respirar
- hinchazón de tobillos o pies
- aumento repentino de peso

Su profesional de la salud podría tener que ajustar o interrumpir el tratamiento con TZD y HUMALOG si usted tiene una insuficiencia cardíaca nueva o que empeora.

**Busque atención médica de emergencia si ha experimentado:**

- problemas para respirar
- dificultad para respirar
- latido cardíaco rápido
- inflamación de la cara, la lengua o la garganta
- sudoración
- somnolencia extrema
- mareo
- confusión

**Los efectos colaterales más comunes de HUMALOG incluyen:**

- bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
- reacciones en el lugar de la inyección
- la piel se engruesa o hay cavidades en el lugar de la inyección (lipodistrofia).
- aumento de peso
- hinchazón de manos o pies
- picazón
- erupción

**Estos no son todos los posibles efectos secundarios de HUMALOG.**

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088.

**Información General acerca del uso seguro y efectivo de HUMALOG KwikPen.**

A veces se prescriben medicamentos para fines diferentes de los que se detallan en el folleto de Información para el Paciente. No use HUMALOG para una afección para la que no se haya prescrito. No regale HUMALOG a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas que usted. Puede causarles daño.

Este folleto de Información para el paciente resume la información más importante acerca de HUMALOG KwikPen. Si desea obtener más información, comuníquese con su proveedor de salud. Puede solicitar a su farmacéutico o proveedor de salud información sobre HUMALOG redactada para los profesionales de la salud.

**¿Cuáles son los ingredientes de HUMALOG U-200?**

**Ingrediente activo:** insulina lispro.

**Ingrediente inactivo:** glicerina, trometamina, metacresol, óxido de zinc (ion de zinc), trazas de fenol y agua para inyección.

Humalog® y Humalog KwikPen® son marcas registradas de Eli Lilly and Company.

Comercializado por: Lilly USA, LLC, Indianápolis, IN 46285, EE. UU.

Derechos de autor © 2015, 2019, Eli Lilly and Company.

Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, visite [www.humalog.com](http://www.humalog.com) o llame al 1-800-545-5979.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Revisado: noviembre de 2019

LOG200-0003-PPI-20191115

PP-HI-US-1422



HUMALOG KwikPen®  
Inyección de insulina lispro

LOG200-0003-PPI-20191115